

ぜんそく発作がでた！

発作止めの吸入()

20分

改善した場合はしばらく服薬をあきましょう

改善しない場合

発作止めの吸入()

20分

改善した場合はしばらく服薬をあきましょう

改善しない場合

すぐに医療機関を
受診しましょう！

3日以内にかかりつけ医療を
受診しましょう

発作止めの吸入薬とは、…マザーホン(アトランチヘルス)・アイロヘルス・オルタナヘルス…などの喘息発作用の初期治療薬を併用する人薬で、発作発作が出現したときにその症状を改善させるための薬剤です。

重 症 度 軽症発作 中症発作 平等症 重症

人工呼吸管理 あり なし 不明

過去1年以内 入院あり 救急室訪問あり 不明

アスピリシン過敏 あり なし 不明

抗ヒアレルギー あり なし 不明
使用不可箇所 ()

持 施 品 種 吸入ステロイド ()
 ステロイド吸入器 バクテ フラム ()

風きの治療

特記事項

私は気管支ぜんそく患者です

フリガナ

氏 名

生年月日 年 月 日 生

現住 所

電 話 () -

郵 船 所

(会社・会社) () -

勤 勤 所

電 話 () -

かかりつけ医療機関

*施設名

*住所名

*連絡先

電 話 () -
FAX () -

発作時救急医療機関

*施設名

*連絡先

電 話 () -
FAX () -

カーブ電話番号

施行年月日 年 月 日

健診用紙改訂版第2版(平成25年版)