

おぼれた

おぼれた

すぐに水から引き上げる!

- 1 意識がない。
- 2 ぐったりしている。



119

救急車を呼ぶ!

救急車が来るまでの対応

●応急処置1

水を大量に飲んで
いる可能性があるの
で、子供をうつぶせ
で頭が低くなる体勢
を取り、背中を少し
強めに叩いて下さい。

●応急処置2

心肺蘇生
(41・42ページ)



事故 防止

- 乳幼児のおぼれ事故の多くは、家庭内で起こっています。
- 浴槽、洗濯機はふたを閉め、水を抜いておくようにしましょう。
- 洗濯機にはチャイルドロックをしておきましょう。
- お風呂での首にする浮き輪の使用はやめましょう。
- トイレの便器もふたを閉め、ドアをしっかり閉めましょう。
- 家庭用プール、水槽等にも注意しましょう。
- 近所の水路などの状況も把握しておきましょう。

- 1 顔色が悪い。
- 2 ぼんやりしている。
- 3 泣かない。

1つでも
「はい」
がある



救急医療機関

(3次救急へ)
岐阜大学医学部附属病院
岐阜県総合医療センター
大垣市民病院
中濃厚生病院
県立多治見病院
高山赤十字病院

- 1 引き上げてすぐに
大声で泣く。
- 2 意識がしっかりし
ている。

1つも
「はい」
がない

時間とともに、具合が
悪くなったら救急医療
機関を受診。

安静に寝かせて、し
ばらく様子を見る。