

刺された

ハチに刺された

大量
(10カ所)
以上
刺された

さされて10分以内に
1 発疹がでた。
2 顔色が悪く、息苦し
そうだ。
3 声が出にくそう。

1つでも
「はい」
がある

1つも
「はい」
がない



一次・二次救急医療機関
を受診してください(2~5ページ)

時間とともに、具合
が悪くなったら救急医
療機関を受診

翌日の朝など、かかり
つけ医の先生に診ても
らってください。

自宅での 対処方法

- ハチにさされたら刺入された毒針を取り除き、毒を搾り出すように、刺された部位を周囲から圧迫して石けんと水で患部をよく洗って冷やします。
- アンモニア水の使用は、理論的には効果が期待できません。

すり傷・切り傷・刺し傷

119番に電話してください

○たくさん出血し出血性ショックの状態であるとき。

(転倒・転落(26ページ)も参考に)

主な症状 ●唇は紫色または白っぽい

●皮膚は冷たい ●冷や汗が出ている

すり傷・切り傷 ●●●●●●

観察のポイント

○汚れていて、湿った場所で切ったりすったりした。

○出血が多い。

○出血が止まらない。

○3～4日たってもジクジクして赤く腫れてきた。

救急医療機関を受診してください

○すり傷

●傷が浅くても、砂や泥が傷口からとりきれない範囲が広い場合。

○切り傷

●深い傷であり傷口が大きく、直接圧迫の方法で止血しても出血が止まらない大出血の場合は、直接圧迫して止血しながら間接止血法を併用して病院へ。

●包丁、はさみ、彫刻刀等で指等を切断したり皮膚等を削ってしまったときは、指・皮膚等を持参し病院へ。
(切断した指、削った皮膚等は、しめったガーゼ等でくるみ、乾いたビニール袋等に入れ密閉しその袋を氷の入った容器に入れて持参)

●傷が浅くても、不潔な場所で切り傷を負った場合(破傷風の心配があります。)

家庭でできる応急手当

○傷を洗ってください。水道水はほとんど無菌ですのでたっぷりの流水で汚れを洗い流してください。(範囲が1cm程度の場合であって出血がすぐ止まる場合は、安心してよいでしょう。)

○服などでこすれる場合は、バンソウコウ等をはります。

医療機関を受診してください

○3～4日たっても傷がジクジクしていたり、赤く腫れてきた場合は化膿していますので医療機関を受診してください。

○アスファルトやコンクリート等の固い面で転倒等してできた浅いすり傷であっても、強くこすっている場合は、やけどと同じようになる場合があります。

○自転車に足等を巻き込んだ場合のすり傷。

ワンポイントアドバイス

○傷口への塗り薬は傷口を痛めたり治療の邪魔になることの方が多いのでやめましょう。

特にキズを乾かして治す薬は絶対にやめましょう。

止血法

○直接圧迫の方法(主にこの方法で止血します)

毛細血管や静脈からしみ出る出血は、ガーゼや清潔な布キレ、ハンカチなどを傷口に当て、強く圧迫することにより止血できることが多い。

○間接圧迫止血法

傷口を直接圧迫しながら、傷口から心臓に近い動脈を、骨に向かって指で押さえることで、血液の流れを止める方法です。

刺し傷 ●●●●●●

観察のポイント

○ガラス、木片などで刺したものが。

○汚い場所、汚いもので刺した。

○刺し傷が深いか。

家庭でできる応急手当

○まず、傷を洗ってください。水道水はほとんど無菌ですのでたっぷりの流水で汚れを洗い流してください。

救急医療機関を受診してください

○針等を刺して、針が体内に残っていると考えられる場合。

○汚いものを刺した傷(さびたクギ等)。

○1cm以上の深い傷(神経・腱を切っている可能性がある)。

医療機関を受診してください

○とげが深く刺さって抜けないとき、または周囲が赤く炎症をおこし始めたときは、家庭では手当てしにくいので受診してください。

○ガラス片が刺さってとれないとき、細かい木片が刺さってとれないとき。

○3～4日たっても傷がジクジクしていたり、赤く腫れてきた場合は化膿していますので医療機関を受診してください。